

MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL SARS-COV-2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DELLA ASL ROMA 5 :

Durata del progetto : Il presente progetto ha una durata di otto mesi, da ottobre 2021 a maggio 2022

Razionale : La ASL Roma 5 è una delle tre ASL pilota della Regione Lazio per il movimento delle Scuole che Promuovono Salute (DGR n. 721 del 08/10/2019), dal 2019 il gruppo SPS opera a sostegno delle scuole del territorio per l'implementazione e lo sviluppo della "Rete SHE", secondo il modello europeo.

La campagna di screening sarà effettuata utilizzando il test salivare (Lollisponge) , che ha il vantaggio sia di non essere invasivo che di potere essere eseguito in modo autonomo dalla famiglia (quindi in assenza di operatori sanitari)

Come effettuare il tampone salivare in 4 semplici step:



1. APRI IL TAMPONE E INTRODUCILO IN BOCCA TOCCANDO SOLO IL TAPPO.



**2.IMPREGNA BENE DI SALIVA
IL TAMPONE, USALO COME SE
FOSSE UN CHUPA-CHUPS PER
ALMENO 2 MINUTI (ANCHE DI PIÙ SE IL
TAMPONE NON SI È IMBIBITO BENE DI SALIVA!)**



IMPORTANTE:

**IL TAMPONE DEVE ESSERE BEN IMBITO DI SALIVA
PER POTER ESSERE ANALIZZATO IN LABORATORIO.**

3. PASSA IL TAMPONE TRA LA GUANCIA E LA LINGUA, SOPRA E SOTTO LA LINGUA;
4. RICHIUDI IL TAMPONE NELLA PROVETTA E CONSEGNALO A SCUOLA.

Tampone dopo l'uso e ben imbibito di saliva

Tampone prima dell'uso



Attenzione: se trascorsi i due minuti il tampone non è ancora ben imbibito (vedere foto) continuare il test

Il prelievo di saliva è un metodo semplice, meno invasivo rispetto al tampone naso-orofaringeo. Il campione viene raccolto facendo impregnare di saliva all'alunno/a una spugnetta sterile per almeno 2 minuti.

Il prelievo deve essere effettuato:

- ▶ appena svegli;
- ▶ a digiuno oppure a distanza di almeno 30 minuti dall'assunzione di cibo o bevande e dalla pulizia dei denti.

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO ALLO SCREENING!



IL GRUPPO SPS